

レジメン名	DTX3週おき (ドセタキセル 3W)							療法
疾患名	乳癌							
【レジメン内容】								
商品名	一般名	略号	投与ルート	投与量	Day 1	Day8	Day15	
ドセタキセル	ドセタキセル	DTX	点滴静注	60 or 75 mg/m ²	●	休	休	
【1クールの間】								
* day1から次回day1までの期間:(21)日間								
* 投与量 60mg/m ² (再発・転移) 75mg/m ² (術前・術後)6クール								
【投与方法】								
1) グラニセトロン点滴静注バック1mg/50mL + デキサメタゾン6.6mg 30分								
2) ドセタキセル (60mg/m ² or 75mg/m ²) + 5%ブドウ糖液250mL 60分								
3) 生理食塩液50mL 10分								
化学療法翌日より浮腫予防、悪心・嘔吐予防に デキサメタゾン錠0.5mg 8錠または16錠分2 2日間経口投与								
【注意事項】								
・ドセタキセル投与中に呼吸困難感を訴えた場合はアナフィラキシーの可能性あるため直ちに投与を中止する。								
・ドセタキセル投与中痒み発疹が出た場合は、前投薬として抗ヒスタミン剤の使用も考慮に入れる。(ガスター注、ポララミン注)								