

レジメン名	EC	療法
-------	----	----

疾患名	乳癌
-----	----

**【レジメン内容】**

商品名	一般名	略号	投与ルート	投与量	Day1	Day8	Day15
エピルビシン	エピルビシン塩酸塩	EPI	点滴静注	90 mg/m <sup>2</sup>	●	休	休
エンドキサン	シクロホスファミド	CPA	点滴静注	600 mg/m <sup>2</sup>	●	休	休

**【1クールの間】**

\* day1から次回day1までの期間:( 21 )日間 8クール施行

**【投与方法】**

- 1) グラニセトロン点滴静注バック1mg/50mL + デキサメタゾン6.6mg 30分
- 2) エピルビシン (90mg/m<sup>2</sup>) + 生理食塩液50mL 15分
- 3) エンドキサン (600mg/m<sup>2</sup>) + 生理食塩液100mL 30分
- 4) 生理食塩液50mL 10分

アンスラサイクリン含有レジメンでは後投薬として、急性悪心/嘔吐予防薬デキサメタゾンを使用する。

デキサメタゾン錠0.5mg 16錠分2 3日間

**【注意事項】**

- ・エピルビシン投与開始前に心機能に問題がないことを確認する。(駆出率EF50%以上)
- ・蓄積性心毒性予防のためエピルビシンの総投与量は800~900mg/m<sup>2</sup>までに留める。
- ・予期性嘔吐予防には、マイナートランキライザーを使用する。 例)ワイパックス3錠分3 day0(前日)~6日の7日間
- ・エピルビシンを血管外に漏出させると皮膚潰瘍を起こす可能性があるので、血管確保を確実にを行う。