

レジメン名	FOLFIRI							療法
疾患名	切除不能大腸癌							
【レジメン内容】								
商品名	一般名	略号	投与方法	1日投与量	Day1	Day8		
イリノテカン	イリノテカン塩酸塩	CPT-11	点滴静注	150mg/m ²	●	休		
レボホリナート	レボホリナートCa	L-LV	点滴静注	200mg/m ²	●	休		
フルオロウラシル	フルオロウラシル	5-FU	急速静注	400mg/m ²	●	休		
フルオロウラシル	フルオロウラシル	5-FU	持続静注	2400mg/m ²	●	休		
【1クルの期間】								
* day1から次回day1までの期間:(14)日間								
【投与方法】								
1) グラニセトロン点滴静注バック1mg/50mL + デキサメタゾン6.6mg 30分								
2) 5%ブドウ糖250mL + イリノテカン(150mg/m ²) 120分								
2') 5%ブドウ糖250mL + レボホリナート(200mg/m ²) 120分 (イリノテカンの側管より投与)								
3) 5%ブドウ糖50mL +フルオロウラシル(400mg/m ²) 全開								
4) 生理食塩液 + フルオロウラシル(2400mg/m ²) 全量230mL 持続ポンプ使用 46時間								
5) ヘパフラッシュ100単位/mL 10mL								