


レジメン名	IRIS (TS-1(2投2休)+IRI)	療法
-------	-----------------------	----

疾患名	転移再発大腸癌
-----	---------

**【レジメン内容】**

商品名	一般名	略号	投与方法	1日投与量	Day1	Day8	Day15	Day22
イリノテカン	イリノテカン	CPT-11	点滴静注	125mg/m <sup>2</sup>	●	休	●	休
エスワン	テカフル/ギメラシル/ オテラシルカリウム	S-1	経口	★80~120mg/m <sup>2</sup>	 Day1~14内服		休	休

体表面積

★1.25m<sup>2</sup>未満 40mg×2

★1.25m<sup>2</sup>以上 1.5m<sup>2</sup>未満 50mg×2

★1.5m<sup>2</sup>以上 60mg×2

**【1クールの間】**

\* day1から次回day1までの期間: ( 28 )日間

S-1は2週内服後、2週休薬

**【投与方法】**

1) グラニセトロン点滴静注バック1mg/50mL + デキサメタゾン6.6mg 30分

2) 5%ブドウ糖500mL + イリノテカン(125mg/m<sup>2</sup>) 90分

3) 生理食塩液50mL 全開

内服: S-1 80~120mg/日 分2朝夕食後 14日間 (day1夕~day15朝)

**【注意事項】**

・S-1はCCr(ml/min) 80未満で減量基準あり、30未満は投与不可。