


|       |                      |    |
|-------|----------------------|----|
| レジメン名 | IRIS+Bmab(TS-1 2投2休) | 療法 |
|-------|----------------------|----|

|     |               |
|-----|---------------|
| 疾患名 | 切除不能な進行・再発大腸癌 |
|-----|---------------|

**【レジメン内容】**

| 商品名    | 一般名                      | 略号     | 投与方法 | 1日投与量                    | Day1   | Day8 | Day15 | Day22 |
|--------|--------------------------|--------|------|--------------------------|--|------|-------|-------|
| アバステン  | ベバシズマブ                   | Bmab   | 点滴静注 | 5mg/kg                   | ●  | 休    | ●     | 休     |
| イリノテカン | イリノテカン塩酸塩                | CPT-11 | 点滴静注 | 125mg/m <sup>2</sup>     | ●  | 休    | ●     | 休     |
| エスワン   | テガフル/キメラシル/<br>オテラシルカリウム | S-1    | 経口   | ★80~120mg/m <sup>2</sup> | <br>Day1~14内服 |      | 休     | 休     |

体表面積  
 ★1.25m<sup>2</sup>未満 40mg × 2  
 ★1.25m<sup>2</sup>以上 1.5m<sup>2</sup>未満 50mg × 2  
 ★1.5m<sup>2</sup>以上 60mg × 2

**【1ケールの期間】**

\* day1から次回day1までの期間:( 28 )日間

S-1は2週間内服後、2週間休薬

**【投与方法】**

- 1) デキサメタゾン6.6mg + グラニセトロン点滴静注バック1mg/50mL 30分
- 2) ベバシズマブ(5mg/kg) + 生理食塩液100mL 90分 (2回目以降は60分、3回目以降は30分投与可)
- 3) イリノテカン(125mg/m<sup>2</sup>) + 5%ブドウ糖500mL 90分
- 4) 生理食塩液50mL 全開

内服薬:S-1 80~120mg 分2 朝夕食後 14日間 (day1夕~day15朝)

**【注意事項】**

- ・S-1はCCr(ml/min) 80未満で減量基準あり、30未満は投与不可。
- ・ベバシズマブとブドウ糖溶液を混合すると力価の減弱が生じるため生理食塩液を使用する。