

| | | |
|-------|------------------------------------|----|
| レジメン名 | RAM + PTX (サイラムザ+weeklyパクリタキセル) | 療法 |
|-------|------------------------------------|----|

| | |
|-----|----|
| 疾患名 | 胃癌 |
|-----|----|

【レジメン内容】

| 商品名 | 一般名 | 略号 | 投与方法 | 1日投与量 | Day 1 | Day8 | Day15 | Day22 | |
|---------|---------|-----|------|---------------------|-------|------|-------|-------|--|
| サイラムザ | ラムシルマブ | RAM | 点滴静注 | 8mg/kg | ● | 休 | ● | 休 | |
| パクリタキセル | パクリタキセル | PTX | 点滴静注 | 80mg/m ² | ● | ● | ● | 休 | |

【1ケールの期間】

* day1から次回day1までの期間:(28)日間

【投与方法】

Day1、15

- 1) 生理食塩液50mL + ポララミン5mg + ファモチジン20mg 30分
- 2) グラニセトロン点滴静注バック1mg/50mL + デキサメタゾン6.6mg 30分
- 3) ラムシルマブ (8mg/kg) + 生理食塩液 250mL 60分
- 4) パクリタキセル (80mg/m²) + 生理食塩液250mL 60分
- 5) 生理食塩液50mL 全開

Day8

- 1) 生理食塩液50mL + ポララミン5mg 30分
- 2) 生理食塩液50mL + ファモチジン20mg + デキサメタゾン6.6mg 30分
- 3) パクリタキセル (80mg/m²) + 生理食塩液250mL 60分
- 4) 生理食塩液50mL 全開

【注意事項】

・パクリタキセルの副作用であるアナフィラキシーの予防のためステロイド(デカドロン)、抗ヒスタミン、H2ブロッカーの投与をパクリタキセル投与30分前に行い、投与開始ご5~10分は医師が監視していることが望ましい。副作用と疑う臨床症状が見られた場合には直ちに投与を中止し適切な処置(ステロイドの投与など)行う。

・パクリタキセルの希釈液はブドウ糖又は生食250mL~500mL