

レジメン名	S-1 + CDDP (TS-1(3投2休)+CDDP)	療法
疾患名	転移再発胃癌	

【レジメン内容】

商品名	一般名	略号	投与方法	1日投与量	Day 1	Day 8	Day15	Day22	Day29
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	点滴静注	60mg/m ²	休	●	休	休	休
エスワン	テガフル/ギメラシル/ オテラシルカリウム	S-1	経口	★80~120mg/日	Day 1~21内服			休	休

体表面積
 ★1.25m²未満 40mg×2
 ★1.25m²以上 1.5m²未満 50mg×2
 ★1.5m²以上 60mg×2

【1ケールの期間】

* day1 から次回day1までの期間:(35)日間

S-1は3週間投与、2週間休薬

【投与方法】

初日(末梢①メイン)

- ①ラクテック500mL 11:00-13:00
- ②ラクテック500mL 13:00-16:00
- ③ラクテック500mL 16:00-19:00
- ④ラクテック500mL 19:00-24:00

2日目(末梢①メイン)

- ①ラクテック500mL 0:00-4:00
- ②ラクテック500mL 4:00-8:00
- ③ラクテック500mL 8:00-14:00

初日(末梢①側管①)

- ①グラニセロン点滴静注バック1mg/50mL+デキサメタゾン
13.2mg+メトクロプラミド10mg
13:00~13:30

2日目(末梢①側管①)

- ①メトクロプラミド10mg+生食100mL
10:00-10:30
- ②グラニセロン点滴静注バック1mg/50mL
10:30-11:00
- ③ソルデム3AG500mL 11:00-13:30

- ②シスプラチン(60mg/m²)+生食250mL 14:00-16:00

- ③生食100mL+フロセミド20mg
(20時までの尿量が800mL以下の時全開で)

初日(末梢①側管②)ハイドレーションルート

- ①ソルデム3AG500mL(シスプラチンと同時に開始)14:00~17:00
- ②ソルデム3AG500mL 17:00-20:00

内服:S-1 80~120mg/日 分2朝夕食後 21日間 (day1夕~day22朝)

【注意事項】

・投与前に必ず腎機能のチェック(生化学、24時間クレアチンクリアランス試験等)を行い、クレアチンクリアランスが50mL/min以上であることを確認する。

・S-1はCCr(ml/min) 80未満で減量基準あり、30未満は投与不可。