

レジメン名	S-1 + DTX (術後補助 S-1+ドセタキセル併用)	療法
疾患名	胃癌	

【レジメン内容】

1クール目(1クールの期間:21日間)

商品名	一般名	略号	投与方法	1日投与量	Day1	Day8	Day15
エスワン	テガフル/ギメラシル/ オテラシルカリウム	S-1	経口	★80~120mg/日	 Day 1~14内服		休

2~7クール目(1クールの期間:21日間)

商品名	一般名	略号	投与方法	1日投与量	Day1	Day8	Day15
エスワン	テガフル/ギメラシル/ オテラシルカリウム	S-1	経口	★80~120mg/日	 Day 1~14内服		休
ドセタキセル	ドセタキセル	DTX	点滴静注	40 mg/m ²	●	休	休

8クール目以降、術後1年まで継続(1クールの期間:42日間)

商品名	一般名	略号	投与方法	1日投与量	Day1	Day8	Day15	Day22	Day29	Day36
エスワン	テガフル/ギメラシル/ オテラシルカリウム	S-1	経口	★80~120mg/日	 Day 1~28内服				休	休

体表面積
 ★1.25m²未満 40mg×2
 ★1.25m²以上 1.5m²未満 50mg×2
 ★1.5m²以上 60mg×2

【投与方法】

1クール目(内服薬のみ)

内服:S-1 80~120mg/日 分2朝夕食後 14日間 7日間休薬

2~7クール目

- 1) グラニセトロン点滴静注バック1mg/50mL + デキサメタゾン6.6mg 30分
- 2) ドセタキセル(40mg/m²) + 5%ブドウ糖液250mL 60分
- 3) 生理食塩液50mL 全開

内服:S-1 80~120mg/日 分2朝夕食後 14日間 (day1夕~day15朝)

8クール目以降(内服薬のみ)

内服:S-1 80~120mg/日 分2朝夕食後 28日間 14日間休薬

【注意事項】

・S-1はCCr(ml/min) 80未満で減量基準あり、30未満は投与不可。