

レジメン名	S-1 + PTX (TS-1(2投1休)+パクリタキセル)						療法
疾患名	転移再発胃癌						
【レジメン内容】							
商品名	一般名	略号	投与方法	1日投与量	Day 1	Day 8	Day 15
パクリタキセル	パクリタキセル	PTX	点滴静注	50mg/m ²	●	●	休
エスワン	テガフル/キメラシル/ オテラシルカリウム	S-1	経口	★80~120mg/日	 Day 1~14内服		休
				体表面積			
				★1.25m ² 未満	40mg × 2		
				★1.25m ² 以上 1.5m ² 未満	50mg × 2		
				★1.5m ² 以上	60mg × 2		
【1クールの期間】							
* day1から次回day1までの期間:(21)日間							
S-1は2週間投与、1週間休薬							
【投与方法】							
1)生理食塩液100mL + ポララミン5mg + デキサメタゾン6.6mg 30分							
2)生理食塩液100mL + ファモチジン20mg 30分							
3)5%ブドウ糖250mL + パクリタキセル(50mg/m ²) 60分							
4)生理食塩液50mL 全開							
内服:S-1 80~120mg/日 分2朝夕食後 14日間 (day1夕~day15朝)							
【注意事項】							
<ul style="list-style-type: none"> ・パクリタキセルの副作用であるアナフィラキシーの予防のためステロイド(デカドロン)、抗ヒスタミン、H2ブロッカーの投与をパクリタキセル投与30分前に行い、投与開始ご5~10分は医師が監視していることが望ましい。副作用と疑う臨床症状が見られた場合には直ちに投与を中止し適切な処置(ステロイドの投与など)行う。 ・パクリタキセルの希釈液はブドウ糖又は生食250mL~500mL ・S-1はCCr(ml/min) 80未満で減量基準あり、30未満は投与不可。 							