

レジメン名	T C (術後) 4クール	療法
-------	---------------	----

疾患名	乳癌
-----	----

【レジメン内容】

商品名	一般名	略号	投与ルート	投与量	Day1	Day8	Day15
ドセタキセル	ドセタキセル	DTX	点滴静注	70 mg/m ²	●	休	休
エンドキサン	シクロホスファミド	CPA	点滴静注	600 mg/m ²	●	休	休

【1クールの期間】

* day1から次回day1までの期間:(21)日間 4クール実施

【投与方法】

- 1) デキサメタゾン6.6mg + パロノセトロン0.75mg + 生理食塩液 100mL 30分
- 2) ドセタキセル(70mg/m²) + 5%ブドウ糖液 250mL 60分
- 3) エンドキサン(600mg/m²) + 生理食塩液 100mL 30分
- 4) 生理食塩液50mL 全開

化学療法翌日より浮腫予防、悪心・嘔吐予防に、デキサメタゾン錠0.5mg 16錠分2 2日間経口投与

【注意事項】

- ・好中球減少(Grade4/発熱性)に対する対策
- ①3日目にジーラスタ1A皮下注(午前11時ごろ)
- ②抗生剤処方:レボフロキサシン(500)1T1 X3日分 (38℃以上で内服)