

レジメン名	SOX (TS-1(2投1休)+OX)							療法
疾患名	切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌							
【レジメン内容】								
商品名	一般名	略号	投与方法	1日投与量	Day1	Day8	Day15	
オキサリプラチン	オキサリプラチン	L-OHP	点滴静注	130mg/m ²	●	休	休	
エスワン	テガフル/キメラシル/ オテラシルカリウム	S-1	経口	★80~120mg/日	→ Day1~14内服		休	
<p>体表面積</p> <p>★1.25m²未満 40mg × 2</p> <p>★1.25m²以上 1.5m²未満 50mg × 2</p> <p>★1.5m²以上 60mg × 2</p>								
【1クールの間】								
* day1から次回day1までの期間:(21)日間								
S-1は2週間内服後、1週間休薬								
【投与方法】								
1) グラニセトロン点滴静注バック1mg/50mL + デキサメタゾン6.6mg 30分								
2) 5%ブドウ糖500mL + オキサリプラチン(130mg/m ²) 120分								
3) 5%ブドウ糖50mL 全開								
内服:S-1 80~120mg/日 分2朝夕食後 14日間 (day1夕~day15朝)								
【注意事項】								
・S-1はCCr(ml/min) 80未満で減量基準あり、30未満は投与不可。								
・オキサリプラチンは塩化物と配合することにより不安定となるため輸液は5%ブドウ糖を使用する。								
・オキサリプラチンに対するアナフィラキシー様反応出現時は症状緩和のため、副腎皮質ステロイド剤の増量(デキサメタゾン20mg)、抗ヒスタミン剤の追加使用。もしくはレジメンの変更を検討する。								